

FACTORES ETIOPATOGÉNICOS Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE MÜLLER-WEISS

V. Martín-Gorgojo, M.C. Blasco-Mollá, F. Forriol Brocal, Á. Aguilar Hernández
A. M. Olivas Marín, M. Sánchez González y A. Guillot Ferriols

El Müller Weiss es una displasia del desarrollo del escafoides tarsiano, condicionado por un retraso de osificación. Es necesario además fuerzas de compresión desiguales sobre el escafoides, centrada en la parte lateral del mismo. Asocian por tanto un varo de retropié casi constante. Produce un "pie plano paradójico"

O
B
J
E
T
I
V
O
S

Ppal

Describir la incidencia de Enfermedad de Müller Weiss (EMW) y los factores socioeconómicos condicionantes de su aparición.

2ºos

1. Describir las características clínicas y sociodemográficas de los pacientes
2. Corroborar la asociación entre EMW y los factores socioeconómicos descritos por Maceira y Rochera
3. Describir el tratamiento realizado

Estudio retrospectivo
observacional

2019 ↔ 2021

Análisis descriptivo IBM SPSS

Variables demográficas, movimientos migratorios en infancia, edad de inicio laboral, trabajos o deporte de alta demanda, varo de retropié, índice minus, bilateralidad, estadio EMW, problemas dentición...

M
&
M

Variables

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S

6039 21

Edad de inicio de síntomas: 41,9+/- 20,3 años

Bilateral: 29%

Edad de inicio de laboral: 14,6+/- 4,5 años

Movs migratorios: 60%

Tratamiento ortopédico: 58,3%

Problemas dentición: 43,3%

Tratamiento quirúrgico: 41,7%

Artrodesis

Osteotomía
calcáneo

23,3%

18,3%

CONCLUSIONES

Entidad poco prevalente. 6ª década vida
Más frecuente en mujeres
Más frecuente bilateral
Mayor incidencia ptes nacidos alrededor Guerra Civil y movimientos migratorios masivos quinta década s.XX
Tratamiento no bien establecido. Osteotomía de calcáneo ppal tto quirúrgico

CITE: <https://doi.org/10.1016/j.recot.2023.02.004>