

# ABORDAJE ANTERIOR PARA FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO PEDIÁTRICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA

D. GONZÁLEZ-MORGADO, F. BLASCO-CASADO, E. GUERRA-FARFÁN, J.M. DE MARÍA PRIETO, U. JAMBRINA-ABASOLO, Y. LARA-TARANCHENKO, S. EKHTIARI Y F. SOLDADO

13% FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS NECESITAN REDUCCIÓN ABIERTA




## ¿ABORDAJE?

REVISIÓN SISTEMÁTICA. 19% ESTUDIOS  
PUNTUACIÓN MINORS MEDIA FUE DE 13,05



EVIDENCIA MALA

483 PACIENTES  
EDAD MEDIA: 7 AÑOS  
SEGUIMIENTO: 18,5 M



SATISFACCIÓN:

97,7% SATISFACTORIO

RESULTADOS ESTÉTICOS:

98,6% SATISFACTORIO

(COMPLICACIONES (9,5% )):

RANGO MOV:

ÚBITO VARO:

LESIONES VN:

INFECCIÓN:

CIATRIZ HIPT:

ÚBITO VALGO:



### VENTAJAS:

VISUALIZACIÓN DE FOCO DE FRACTURA

VISUALIZACIÓN HAZ NV

REPARACIÓN LESIONES ASOCIADAS

EL ABORDAJE ANTERIOR ES SEGURO Y EFECTIVO EN EL MANEJO DE FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS DE HÚMERO PEDIÁTRICAS, CUANDO SE REQUIERA UN ABORDAJE ABIERTO.