

PREVENCIÓN DE EVENTOS TROMBÓTICOS EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE ARTRODESIS LUMBAR POR VÍA POSTERIOR: EXPERIENCIA EN NUESTRO CENTRO. ESTUDIO RETROSPECTIVO DE CASOS

M. DESVIAT RUIZ, P. JORDÁ GÓMEZ, K. RAMÓN LÓPEZ, J.M. ROMERO MARTÍNEZ, J.J VALLS VILALTA, N.FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Á. (HULVI GIMENO, L. (UNAT NAVARRO, J. POYATOS CAMPOS



ESTUDIO RESTROSPECTIVO

153 PACIENTES


♀ 39,2%
♂ 60,8%
EDAD: 60 AÑOS ($\pm 13,27$)

🚰 39,9% HTA: 49,6%

📄 29 ($\pm 3,5$)


👁️ 8,5%

NIVELES ARTRODESADOS (MEDIA: 2,28)



MEDIDAS TROMBOPROFILÁCTICAS

🧦 127 MEDIDAS (COMPRESIÓN MECÁNICA)
💊 14 FARMACOLÓGICA (HBPM)



4 PACIENTES (ON EVENTOS TROMBÓTICOS SINTOMÁTICOS)

♂ 75% (3/4)

🚰 50% (2/4)

HTA 25% (1/4)

📄 28,7

🧦 100% (4/4)

💊 75% (3/4)



3/4 TROMBOEMBOLISMO PULMONAR

† 66% MORTALIDAD

EL USO DE MEDIDAS MECÁNICAS EN TODOS LOS PACIENTES, Y MEDIDAS FARMACOLÓGICAS SOLO EN AQUELLOS QUE PRESENTAN FACTORES DE RIESGO, SE CONSIGUE REALIZAR UNA ADECUADA PREVENCIÓN DE EVENTOS TROMBOEMBÓLICOS, OBTENIENDO UNA TASA DE EVENTOS TROMBÓTICOS SINTOMÁTICOS SIMILAR A LA DESCRITA EN LA LITERATURA, SIN HEMATOMA EPIDURAL SINTOMÁTICO.