

Nombre

Apellido

D.N.I.

PREGUNTAS FICHA 11: MANEJO DEL PACIENTE OSTEOPORÓTICO POR GLUCOCORTICOIDES

11.1. ¿Cuál de las siguientes dosis de glucocorticoides podemos considerar que expone a un paciente a padecer una osteoporosis?

- A. Más de 7,5 mg/día de prednisona
 - B. Dosis equivalentes de otro corticoide diferente a la prednisona durante más de 3 meses
 - C. Cinco mg de corticoides durante más de 3 meses en mujeres postmenopáusicas
 - D. Todas las anteriores
-

11.2. En relación con la osteoporosis inducida por glucocorticoides, señale la opción que le parece más acertada

- A. El tratamiento no está indicado una vez suprimido el tratamiento con glucocorticoides
 - B. En todos los casos hay que emplear la menor dosis eficaz de glucocorticoides durante el menor tiempo posible
 - C. Los controles densitométricos no son necesarios si el seguimiento clínico es adecuado.
 - D. Todas son correctas
-

11.3. En una osteoporosis inducida por glucocorticoides, ¿cuál de las siguientes medidas farmacológicas le parece más adecuada?

- A. Risedronato y zoledronato como fármacos de elección
- B. Teriparatida en casos graves
- C. Suplementos dietéticos de calcio y vitamina D
- D. Todas las anteriores