

Nombre

Apellido

D.N.I.

PREGUNTAS FICHA 4: TRATAMIENTO DE LA OSTEOPOROSIS (INDICACIONES)

4.1. ¿Cuándo le parece que está indicado el tratamiento farmacológico de la osteoporosis?

- A. Cuando el paciente tiene un riesgo de fractura alto
 - B. Cuando el riesgo de fractura es moderado y la DMO es inferior a -2,5 DE
 - C. Sólo cuando la DMO es inferior a -2,5 DE
 - D. A y B
-

4.2. ¿Cuál de los siguientes no se considera factor de riesgo a la hora de indicar el tratamiento farmacológico de la osteoporosis?

- A. Antecedente personal de fractura de muñeca a los 40 años.
 - B. Antecedente familiar de fractura de cadera
 - C. Índice de masa corporal < 20 kg/m²
 - D. Todos los anteriores lo son
-

4.3. En relación con el FRAX Index, señale la afirmación correcta:

- A. Es una herramienta para la determinación del riesgo de fracturas por fragilidad
 - B. Permite calcular el riesgo relativo de fractura de cadera y fractura osteoporótica mayor en los siguientes 5 años sin tratamiento
 - C. Es especialmente útil cuando se aplica a pacientes con alta DMO en la cadera
 - D. No puede comenzarse ningún tratamiento farmacológico de la osteoporosis sin haberlo realizado.
-

4.4. En una mujer de 68 años está indicado un tratamiento farmacológico de la osteoporosis si

- A. Existe una fractura vertebral osteoporótica previa
 - B. El año anterior se produjo una fractura de cuello de fémur
 - C. La DMO en el cuello femoral es \leq 2,5 DE.
 - D. Todas las anteriores
-

4.5. ¿Cuáles de los siguientes acrónimos corresponden a guías internacionales para el manejo de la osteoporosis?

- A. NOGG Y NOS
- B. NOGG Y NOF
- C. KNOOG Y NOF
- D. KNOR Y NOOS